

Operation for kort penisbånd (frenulum breve)

Et kort penisbånd på undersiden af penis kan medføre smerter ved samleje og eventuelt bristning med efterfølgende blødning og arvævsdannelse.

Operationen:

Operationen tager cirka 10 minutter og foregår i lokalbedøvelse, der gives som indsprøjtning under penisbåndet. Der vil være lette smerter i det øjeblik bedøvelsen gives. Lokalbedøvelsen virker i løbet af få minutter. Du vil kunne mærke at lægen rører ved dig, men du vil ikke føle smerte. Med co2-laser foretages evaporation (fordampning) af penisbåndet på tværs, der kan suppleres med en sammensyning af penisbåndet på langs.

Før operationen:

Det forventes, at du har været i bad og har vasket operationsområdet grundigt, før du møder til operation.

Efter operationen:

Der kan være lette smerter, svien og ømhed i operationsområdet, især ved vandladning. Det er helt normalt og forsvinder efter cirka 2-3 dage. Ved behov for smertestillende medicin efter operationen, anbefaler vi, at du tager Panodil, Pinex, Pamol eller lignende, 1000 mg max 4 gange i døgnet.

Huden omkring penis og pung kan efter operationen blive let hævet og misfarvet. Det er dog sjældent og forsvinder i løbet af en uge. Enkelte oplever let nedsat følsomhed i det opererede område.

Såfremt hævelsen ikke forsvinder, du får feber eller der tilkommer rødme/varme omkring såret, skal du kontakte Kirurgisk Klinik Aarhus eller din egen læge.

Undgå hård fysisk aktivitet de første 2 døgn. Skyl såret under rindende vand efter toiletbesøg. Det kan virke lindrende at bruge stramtsiddende underbukser de første dage efter operationen.

Efterforløbet:

Hvis såret er syet, er det med opløselige tråde, som forsvinder af sig selv. Der er normalt ikke brug for kontrol.

Undgå samleje de første 2 uger efter operationen og brug kondom indtil såret er helet.