

Polypper i tyktarm og/eller endetarm

Hvad er polypper i tyk- og endetarmen?

Polypper er udvækster fra slimhinden i tyktarm og/eller endetarm. Polypper er svulster, der som regel er godartede. Man formoder, at de fleste kræftsvulster i tyktarmen udvikler sig fra polypper.

Højrisiko-polypper er:

- Hvis de er større end 1 cm
- Hvis der er mere end 3
- Hvis der er fliget/flosset udseende

Udvikling af polypper:

Polypper opstår som regel tilfældigt, men kan være arveligt.

Man formoder, at kræft i tyk- og endetarm udvikler sig fra normal slimhinde via polyp til en kræftsvulst over en periode på omkring 10 år.

Risikoen for udvikling af kræft hænger her sammen med:

- Polypstørrelse
- Uregelmæssig vækst
- Grad af celleforandringer (dysplasi)

Hvad er symptomer på polypper?

De fleste polypper i tyk- og endetarm giver ingen symptomer og bliver opdaget tilfældigt. Hvis polypper giver symptomer, er det oftest blødning og ændringer i afføringen.

Sådan stilles diagnosen:

Som regel opdages polypper ved en kikkertundersøgelse i ende- eller tyktarmen. Alle polypper, der bliver fundet, skal fjernes og undersøges. Såfremt der findes polypper, bør hele tyktarmen kikkertundersøges.

Sådan behandles polypper:

Alle påviste polypper skal fjernes og vævet/cellerne skal undersøges. En meget lille del af polypperne i tyk- og endetarm udvikler sig til kræft.

Det antages, at det tager ca. 5 år for en polyp at udvikle sig fra normal slimhinde, og 10 år før det eventuelt bliver en kræftsvulst

Lægevidenskaben mangler gode holdepunkter for, hvilke polypper der bør fjernes, hvorfor man fjerner alle.