

Kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm (gastroskopi)

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Undersøgelsen udføres med en bøjelig kikkert – der føres ind gennem munden, ned i spiserøret, mavesækken og ud i tolvfingertarmen. Undersøgelsen kan afsløre om der er sygelige tilstande, f.eks. syreskader, mavesår, betændelsestilstande og godartede eller ondartede svulster.

Forberedelse til gastroskopi:

For at kunne gennemføre undersøgelsen skal mavesækken være fuldstændig tømt. Hvis dette ikke er tilfældet, vil undersøgelsen ikke kunne udføres.

Fasteregler før kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm (gastroskopi):

- ***Du skal være fastende, dvs. du ikke må spise noget 6 timer før undersøgelsen!***
- ***Du må gerne drikke tynde væsker såsom vand, saft, te og kaffe uden mælk/fløde indtil 2 timer før undersøgelsen.***

Hvis du får livsvigtig medicin som f.eks. hjertemedicin, lungemedicin og blodtryksregulerende medicin, kan denne indtages med lidt vand tidligt om morgenen.

Gør det ondt?

Undersøgelsen tager omkring 5-10 minutter og kan foregå med eller uden beroligende medicin (sedativa). Undersøgelsen er ikke smertefuld, men uden medicin skal du forvente et betydeligt ubehag og vedvarende opkastningsfornemmelser imens undersøgelsen står på. Som udgangspunkt tilbydes alle patienter sedativa, dette skal dog på forhånd være aftalt med Kirurgisk Klinik Aarhus.

Risici og komplikationer:

Der forekommer meget sjældent alvorlige skader ved undersøgelsen. I meget sjældne tilfælde (mindre end 1 ud af 10.000) kan der gå hul på spiserøret, og en operation kan da blive nødvendig. Undersøgelsen indebærer en lille risiko for tandskader.

Anvendelsen af beroligende medicin (sedativa) i forbindelse med kikkertundersøgelser er en sikker og veldokumenteret procedure. Brug af beroligende medicin (sedativa) indebærer dog altid en minimal risiko for hjerte-/lunge- eller kredsløbsproblemer.

Efter undersøgelsen:

- ***Hvis du har fået beroligende medicin (sedativa), skal du regne med at blive i klinikken ca. ½ time efter undersøgelsen og du må ikke selv føre motorkøretøjer resten af dagen.***

Du kan spise og drikke som vanligt efter undersøgelsen. Du får information af lægen om resultatet af undersøgelsen, inden du forlader klinikken.

Hvis du i dagene efter undersøgelsen oplever blodigt opkast, tiltagende mavesmerter og/eller feber over 38 grader bedes du kontakte Kirurgisk Klinik Aarhus, din praktiserende læge eller vagtlæge.