

Information om brug af sedering (sedativa) ved undersøgelse eller operation.

Hos Kirurgisk Klinik Aarhus tilbyder vi beroligende medicin (sedativa) til visse undersøgelser og operationer. Medicinen gives gennem et drop, som lægges i en blodåre i armen. Der er ikke tale om en "fuld bedøvelse", men patienten vil typisk have en oplevelse af at have været fuldt bedøvet, herunder manglende erindring omkring operationen/undersøgelsen.

Sedativa anvendes ved kikkertundersøgelser, mindre indgreb eller andre procedurer, hvor der kan opleves ubehag.

Faste og tørste

Du skal møde fastende. Derfor må du ikke spise 6 timer inden undersøgelsen/operationen eller drikke de sidste 2 timer inden undersøgelsen/operationen.

Efter undersøgelsen

Hovedpine, svimmelhed, kulderystelser, kvalme og opkastning kan forekomme i opvågningsfasen, men opvåkning er generelt præget af meget få gener.

Du skal efterfølgende observeres i vores hvilerum i omkring en halv time og du skal være opmærksom på, at du ikke må føre motorkøretøjer samme dag som undersøgelsen/operationen.

Komplikationer

Brug af sedativa indebærer altid en minimal risiko for hjerte-, lunge- og kredsløbsproblemer. Under hele proceduren holder vi øje med dit blodtryk, puls og iltindhold i blodet. Vores erfarne personale har foretaget mere end 10.000 sederinger og er uddannede i administrationen af sedativa og håndteringen af eventuelle komplikationer.

Hvis du lider af alvorlige kroniske sygdomme, herunder hjerte-, lunge- eller kredsløbsproblemer, kan det være du ikke er kandidat til sedering. Denne vurdering foretages af behandlende speciallæge.

Såfremt du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kirurgisk Klinik Aarhus.